

MANEJO PARA TRANFERÊNCIA DAS UNIDADES RESPIRATÓRIAS PARA AS UNIDADES DE INTERNAÇÃO CLÍNICA

Atualizado em 07/08/2020: tempo de precaução e reinternação de paciente COVID.

CASO SUSPEITO DE COVID-19 INTERNADO (IMEDIATAMENTE COLOCADO EM PRECAUÇÃO DE CONTATO E RESPIRATÓRIA NAS UNIDADES/LEITOS DE ISOLAMENTO)

Entre o 3º e o 7º dia do início dos sintomas, coletar exame laboratorial – PCR swab nasofaringe ou aspirado traqueal. Amostra clínica coletada, preferencialmente, até o sétimo dia de início de sintomas.

Manter PRECAUÇÃO DE CONTATO E RESPIRATÓRIA por 20 dias após início de sinais e sintomas (ou, em caso de início dos sintomas respiratórios durante a internação, por 20 dias após o início dos sintomas).

Após os 20 dias se o paciente estiver **ASSINTOMÁTICO****

Retirar paciente da precaução.

Após os 20 dias se o paciente estiver **SINTOMÁTICO**.

Sugere-se discutir caso a caso.

Resultado POSITIVO

Resultado NEGATIVO*

A partir do 10º dia de sintomas, fazer teste rápido (TR)

TR POSITIVO

TR NEGATIVO*

Retirar paciente da precaução.

- Contactante de caso suspeito ou positivo de COVID-19 no hospital clínico: manter medidas de prevenção (higienização das mãos, uso de máscara, etiqueta respiratória, dentre outras). Caso o paciente apresente sinais e sintomas respiratórios, deverá ser encaminhado a uma das unidades de isolamento e seguir manejo/fluxograma de casos suspeito de COVID.
- Acompanhantes: somente exceções, autorizadas pela coordenação. Troca no mínimo a cada 12 horas. Revezamento somente de duas pessoas.
- Reinternação de paciente previamente COVID positivo: rediscutir a precaução e exames caso a caso.

*Se PCR em andamento E TR negativo E ausência de sinais e sintomas após 20 dias de evolução E descartada suspeita clínica de COVID-19, retirá-lo da precaução.

** Assintomático: ausência de sintomas respiratórios que possam estar relacionados à infecção pelo novo coronavírus. Data em que os sintomas cessaram (considerar 24 horas sem febre, sem antitérmicos). Avaliar outras condições que exigiriam precauções específicas (por exemplo: tuberculose, bactéria multirresistente). Caso tenha sido indicado exame de imagem como tomografia, avaliar ausência de achado.

- Paciente com teste rápido positivo deve ser encaminhado para enfermaria de coorte positivo e seguir o manejo do Grupo Santa Casa BH (necessário conferir PCR/teste rápido).
- Quadros virais respiratórios em adultos, 7 dias de precaução. Em caso de COVID-19 positivo, 20 dias. Crianças sempre manter por 20 dias de precaução.