

SIM-P

Síndrome Inflamatória Multissistêmica Pediátrica

Grupo
Santa Casa BH
contra o

CORONAVÍRUS



A notificação da SIM-P potencialmente associada à COVID-19 deverá ser realizada caso seja identificado sujeito que preencha a definição de caso:

Definição de caso preliminar

Caso que foi hospitalizado ou óbito com:
Presença de febre elevada (considerar o mínimo de 38°C) e persistente (≥ 3 dias) em crianças e adolescentes (entre 0 e 19 anos de idade) e...

...Dois dos seguintes sinais e/ou sintomas:

- Conjuntivite não purulenta ou erupção cutânea bilateral ou sinais de inflamação mucocutânea (oral, mãos ou pés);
 - Hipotensão arterial ou choque;
 - Manifestações de disfunção miocárdica, pericardite, valvulite ou anormalidades coronárias (incluindo achados do ecocardiograma ou elevação de Troponina / NT-proBNP);
 - Evidência de coagulopatia (por TP, TTP e D-dímero elevados);
 - Manifestações gastrointestinais agudas (diarreia, vômito ou dor abdominal).
- E também...

...Marcadores de inflamação elevados, como VHS, PCR ou procalcitonina, entre outros; e...

...Afastadas quaisquer outras causas de origem infecciosa óbvia de inflamação, incluindo sepse bacteriana, síndromes de choque estafilocócica ou estreptocócica; e...

... Evidência de COVID-19 (biologia molecular, teste antigênico ou sorológico positivo) ou história de contato com pacientes com COVID-19.

Observação: Podem ser incluídos crianças e adolescentes que preencherem critérios totais ou parciais para a síndrome de Kawasaki ou choque tóxico, com evidência de infecção pelo SARS-CoV-2.

Coleta de exame:

Sorologia IGG: A partir do 10º dia sintomas/contato com caso confirmado para COVID-19, solicitar coleta pelo laboratório HSC.
RT-PCR: O NUVEH, solicitará a coleta mediante a notificação do caso, á FUNED (AMOSTRA COLETADA ENTRE O 3º E 7º dias de início dos sintomas). * Em casos de sintomas respiratórios em que o resultado RT-PCR seja de grande importância para o manejo clínico, o mesmo deverá ser discutido previamente com algum membro do SCIH para liberação de coleta pelo laboratório HSC para resultado em tempo menor.*

Atenção:

- Aplicar precaução padrão para as crianças suspeitas ou confirmadas para SIM-P
- No caso de suspeita de COVID-19 em crianças/adolescentes com quadro respiratório (sintomas atuais ou recentes), seguir fluxo de COVID-19 já instituído no Grupo Santa Casa BH.

Notificação dos casos:

- A notificação deverá ser realizada diretamente no formulário online: <https://redcap.link/simpccovid>
- O notificante deverá encaminhar uma via impressa ao NUVEH (nucleodeepidemiologia@santacasabh.org.br).
- Na impossibilidade de notificação da SIM-P diretamente no formulário online, este deverá ser impresso, preenchido manualmente e enviado ao NUVEH.
- A partir da identificação do caso que atenda aos critérios, a notificação no formulário online, ou repasse das informações ao serviço de vigilância epidemiológica de referência para digitação do caso, deverá ser realizado em até 24 horas.
- A notificação deve ser alimentada diariamente através do código de retorno disponibilizado no ato da notificação.
- Campo observação: informar o valor dos exames.