


# APRENDI

na Santa Casa BH



O QUE É PICC?

**CATETER VENOSO CENTRAL  
DE INSERÇÃO PERIFÉRICA**



## O QUE É PICC?

O Cateter Venoso Central de Inserção Periférica de longa permanência, é um cateter que possibilita a administração de medicamentos a longo prazo, dessa forma, evita de ficar furando o braço do paciente várias vezes.

Tem como objetivo assegurar uma via segura para administração de medicamentos, nutrientes, hemoderivados (medicamentos produzidos a partir do sangue) e também permite coleta de sangue para exames.



## QUAIS OS RISCOS ESTAREI EXPOSTO?

- Infecção do cateter;
- Obstrução do cateter;
- Deslocamento do cateter para fora;
- Inchaço do membro que está o cateter.

Todos os cuidados necessários serão tomados para evitar riscos, que estão relacionados ao uso de qualquer acesso direto na veia.

## QUANTO TEMPO FICAREI COM ESTE PICC?

Se o cateter for bem manipulado, ficará todo tempo do tratamento.

## O QUE OBSERVAR ENQUANTO PERMANEÇO COM O PICC?

- Sinais de Infecção: dor local, inchaço, vermelhidão, febre e secreção.
- Se o curativo (película) está bem fixado.

## COMO DEVE SER REALIZADA A MEDICAÇÃO NO PICC?

- Utilizando apenas seringas de 10ml.
- Lavar as mãos antes do procedimento, calçar luvas de procedimento;
- Realizar limpeza da ponta do cateter do PICC com álcool 70% em movimentos giratórios por 10 vezes;
- Qualquer administração a ser feita no cateter deve-se realizar ANTES e APÓS, lavagem do cateter com 10 ml de soro fisiológico com técnica pulsátil (injeta e para, injeta e para ).
- Utilizando apenas seringas de 10ml.

## CUIDADOS COM O CATETER



- Durante o banho deve-se proteger o curativo e o cateter com saco plástico ou filme transparente plástico;
- Não se deve medir pressão arterial e nem carregar peso no membro com o cateter;
- O cateter deverá ser manipulado apenas por enfermeiros ou técnicos de enfermagem treinados;
- A manutenção do mesmo deverá ser feita a cada 7 dias no ambulatório do Hospital ou pela equipe de atendimento domiciliar.

**Jamais utilizar seringas de 5 ml, 3 ml ou 1 ml pois elas podem ROMPER o cateter.**

- Quando procurar o hospital ou comunicar o atendimento domiciliar?
- Qualquer alteração no local do cateter;
- Quando o cateter accidentalmente for puxado, deslocado ou retirado;
- Quando apresentar sangramento intenso fazer:
  - compressão imediata do local com uma toalha limpa
  - procurar imediatamente o hospital.



**SIGA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES DO SEU MÉDICO!**

A	N	E	N	T	E	R	A	L	O
N	R	E	P	G	K	I	G	V	B
I	F	C	A	K	S	D	O	R	S
N	U	B	L	B	O	J	T	I	T
C	N	E	I	D	C	V	A	E	R
H	C	A	T	E	T	E	R	O	U
A	E	Ã	E	Y	A	N	Ã	A	Ç
Ç	C	U	R	A	T	I	V	O	Ã
O	M	A	D	O	B	E	B	M	O
T	I	N	F	E	C	Ç	Ã	O	R

**AGORA VAMOS PRATICAR?  
ENCONTRE AS PALAVRAS RELACIONADAS.**

**PALAVRAS QUE DEVEM SER COLOCADAS NO CAÇA-PALAVRA:**

- INFECÇÃO
- CURATIVO
- INCHAÇO
- DOR
- CATETER
- OBSTRUÇÃO



# APRENDI

na Santa Casa BH



Santa Casa BH  
SAÚDE DE PONTA PARA TODOS

## SAC SANTA CASA BH HOSPITAL DE ALTA COMPLEXIDADE 100% SUS

 **EMAIL:** [sac@santacasabh.org.br](mailto:sac@santacasabh.org.br)

 **TELEFONE:** (31) 3238-8731

 **ATENDIMENTO PRESENCIAL:** Rua Francisco Sales,  
1111, Santa Efigênia, Belo Horizonte - MG, CEP  
30150-221. O atendimento ocorre no 1º andar, no  
corredor do Salão Nobre, na segunda porta à direita.

Estamos abertos de segunda a quinta-feira, das 8h  
às 18h, e às sextas-feiras, das 8h às 17h.